

TEMPI DI GUARIGIONE

Sopraciglio	6-8 SETTIMANE
SOPRACIGLIO ORIZZONTALE	4 MESI
EARL (VERTICAL EARL)	4 MESI
SETTO	6-8 SETTIMANE
NARICE	3 MESI
CARTILAGINE (PADIGLIONE - CONCA)	3 MESI
TRAGUS	3 MESI
VERTICA TRAGUS	4 MESI
Lobo	4-6 SETTIMANE
LINGUA	4-6 SETTIMANE
LABRET (SNAKE BITE - MEDUSA)	6-8 SETTIMANE
CHEEKS	4-6 SETTIMANE
SMILE	4-6 SETTIMANE
SURFACE	6 MESI
CAPEZZOLO	2-3 MESI
OMBELICO	6-9 MESI
PRINCE ALBERT	4-6 SETTIMANE
AMPALLANG	3 MESI
AMPADRAVYA	3 MESI
FORESKIN	6-8 SETTIMANE
FRENOLUM	6-8 SETTIMANE
CAPPUCCIO - CLITORIDE	6-8 SETTIMANE
GRANDI LABBRA	6-8 SETTIMANE
PICCOLE LABBRA	6-7 SETTIMANE
MICRODERMAL	8 SETTIMANE

I TEMPI DI GUARIGIONE SONO INDICATIVI , E SONO DA INTENDERSI
COME TEMPI MEDI PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI INDIVIDUI.

OGNI PERSONA HA TEMPI DI GUARIGIONE DIFFERENTI DA UN'ALTRA .

SARÀ LA TUA DEDIZIONE ALLA CURA A FACILITARNE IL PROCESSO.

BODY MARTAZIONI PIERCER



T-SHOCK

CORSO di PORTA TICINESE, 6

TEL. 02-8323072

CELL 348-3159916 (MARTA)

MAIL: INFO@T-SHOCKTATTOO.COM

WWW.T-SHOCKTATTOO.COM

FACEBOOK ADDRESS: MARTAPIERCER



É IMPORTANTE SOTTOPORSI AL PIERCING AVENDO:

- BUONO STATO di SALUTE
- ESSERE MAGGIORENNI, OVVERO AUTORIZZATI DA UN GENITORE (ENTRAMBI SE SEPARATI)
- INFORMAZIONI GENERALI PER LA GUARIGIONE

IL PROCESSO DI GUARIGIONE AVVIENE IN DUE FASI:

- PERIODO NECESSARIO AL PIERCING PER CESSARE di PRODURRE SECREZIONI
- PERIODO NECESSARIO AL PIERCING di ASSESTARSI
- DURANTE QUESTO PERIODO SI DEVE SEMPRE INDOSSARE il GIOIELLO, IN QUANTO il PIERCING, se LASCIATO VUOTO, TENDE A CHIUDERSI
- NON SOSTITUIRE il GIOIELLO PRIMA DELLA GUARIGIONE

REGOLE PER LA FASE DI GUARIGIONE

- TOCCARE il PIERCING solo dopo ESSERSI LAVATI LE MANI
- USARE DETERGENTI NEUTRI per la pulizia del corpo.
- PULIRE il PIERCING 2 volte AL GIORNO (MATTINA E SERA)
- EVITARE CHE il PIERCING VENGA A CONTATTO CON SALIVA E ALTRI FLUIDI CORPOREI NON PROPRI
- EVITARE CHE LE CROSTICINE RIENTRINO NEL PIERCING, CHE POTREBBERO FERIRLO E RALLENTARNE LA GUARIGIONE
- INDOSSARE solo INDUMENTI di COTONE A CONTATTO

I SINTOMI D'INFEZIONE SONO:

- GONFIORE, DOLORE, ARROSSAMENTO ECCESSIVO, MANIFESTARSI di ESCRESCENZE tipo BRUFOLO
- Al presentarsi di tali SINTOMI, CONTATTARCI SUBITO
- NON RIMUOVERE il GIOIELLO, CHE CAUSA LA CHIUSURA del PIERCING, IMPEDENDO UNA VELOCE GUARIGIONE
- PER ALLERGIE ESISTONO MATERIALI DIFFERENTI del GIOIELLO (TITANIO E TEFLON)

PIERCING DEL CORPO

- LAVARSI 1 volta AL GIORNO, MATTINA o SERA con SAPONE ANTIBATTERICO, dopo ESSERSI LAVATI LE MANI e il CORPO (con DETERGENTI NEUTRI)
- RIMUOVERE LE CROSTICINE dal GIOIELLO e dalle ESTREMITÀ del PIERCING, la SUPERFICIE deve ESSERE SEMPRE PULITA, quindi FARE COLARE un po' di SAPONE ANTIBATTERICO sul PIERCING MASSAGGIANDOLO DELICATAMENTE FACENDO SCHIUMARE il SAPONE
- LASCIARE AGIRE per 2 MINUTI e SCIACQUARE SOTTO ACQUA CORRENTE
- COME SAPONE NOI CONSIGLIAMO VEA SAPONE DI MARSIGLIA

É NORMALE CHE NEL PRIMO PERIODO di GUARIGIONE INTORNO AL FORO SI MANIFESTI UN AUREOLA di ROSSORE e COMPAIA una SECREZIONE di SIERO BIANCO/GIALLO

- LA CURA del PIERCING dell'OMBELICO richiede l'utilizzo di ABBIGLIAMENTO A VITA BASSA e COTONE 100% A CONTATTO

PIERCING FACCIALI:

- USARE una SOLUZIONE FISIOLÓGICA 100ml
- PRIMA di PULIRE il PIERCING LAVARE BENE LE MANI ed il VISO
- USARE COTON FIOC PER TOGLIERE LE CROSTICINE dal GIOIELLO PRIMA, e dalle ESTREMITÀ del PIERCING dopo
- PER OGNI OPERAZIONE USARE UN COTON FIOC NUOVO
- ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE 2 volte AL GIORNO (MATTINA E SERA)

PIERCING FACCIALE/ORALE:

- RISCIAQUARE la BOCCA con COLLUTORIO due volte AL GIORNO (collutorio DISINFETTANTE)
CONSIGLIAMO CURASET. In ALTERNATIVA succo di LIMONE e ACQUA e SALE
- PER la PRIMA SETTIMANA EVITARE cibi PICCANTI e BEVANDE CALDE, RIDURRE l'uso di TABACCO e ALCOOL, CHE POSSONO CAUSARE IRRITAZIONI
- LA PARETE ESTERNA del PIERCING deve ESSERE PULITA 2 volte AL GIORNO con SOLUZIONE FISIOLÓGICA
- Il GONFIORE nei PRIMI GIORNI È NORMALE

PIERCING LINGUA:

- RISCIAQUARE la BOCCA 4/6 volte AL GIORNO con COLLUTORIO a BASSO CONTENUTO ALCOOLICO (CONSIGLIAMO CURASET)
- PER i PRIMI 2-3 GIORNI USARE il GHIACCIO per RIDURRE il GONFIORE
- PER la PRIMA SETTIMANA EVITARE cibi PICCANTI e BEVANDE CALDE, RIDURRE l'uso di TABACCO e ALCOOL, CHE POSSONO CAUSARE IRRITAZIONI